

EMBARAZADOS sin sífilis

**Evita el riesgo de transmitirle
la sífilis a tu bebé.**

Si nos cuidamos, lo cuidamos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE SALUD

Hazte la prueba



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE SALUD

Siempre con condón



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE SALUD

Control prenatal temprano



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA DE SALUD

**En Bogotá cada día se
diagnostica con sífilis
a 2 mujeres embarazadas.**

**La sífilis es una infección de transmisión
sexual que puede transferirse al bebé
durante el embarazo y causarle graves
problemas de salud, incluso
la muerte.**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE SALUD




**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

La sífilis durante el embarazo puede causar:

- Aborto espontáneo • Muerte fetal**
- Muerte del bebé al poco tiempo después de nacer**

Los bebés que nacen con sífilis congénita pueden tener:

- Deformación de los huesos • Anemia grave**
- Agrandamiento del hígado y el bazo**
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos) • Ceguera o sordera**
- Meningitis • Sarpullido**



**La prueba rápida de sífilis se puede solicitar
sin costo en las Unidades de Servicios
de Salud o en las EPS.**

**El tratamiento
contra la infección es gratuito
y debe realizarse completo
para que sea efectivo.**



Puedes tener sífilis y no saberlo.

**El condón es el único método que
disminuye el riesgo de una infección
de transmisión sexual.**



Todas las mujeres embarazadas
deben hacerse la prueba de sífilis
en el primer control prenatal
y acudir a los siguientes
de manera oportuna.



**Si sospechas que tienes una
infección de transmisión sexual
consulta al médico de inmediato.**

Más información en:
www.saludcapital.gov.co



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**